

Fotografando a passagem das Partículas Elementares

Ricardo Gonalo



09/03
2017

CERN

European Organization for Nuclear Research



Fundado em 1954 por 12 países

Actualmente: 22 estados membros (1986-Portugal)


2500 Engenheiros, Físicos e Técnicos (e func.administ.)

Mais de 13000 utilizadores de todas as partes do mundo

~1100 M€ / orçamento anual





Localização do laboratório CERN




Raios Cósmicos

O maior acelerador do universo








Mas na Terra:

Acelerador Cockcroft-Walton






O ciclotrão







$\Lambda \pi^-$
 $p \pi^-$

O acelerador linear



Aceleradores no CERN


Sincrotrão!



$\pi^+ \pi^-$


+60 anos de história no CERN ainda operacionais

CERN Accelerator Complex




LHC Large Hadron Collider SPS Super Proton Synchrotron PS Proton Synchrotron
 AD Antiproton Decelerator CTF3 Clic Test Facility
 CNGS Cern Neutrinos to Gran Sasso ISOLDE Isotope Separator OnLine DEvice
 LEIR Low Energy Ion Ring LINAC LINEar ACcelerator n-ToF Neutrons Time Of Flight

Overall view of the LHC experiments.



Colisões de feixes de partículas



LHC:

Nº pacotes = 2808

Protões / pacote = 10^{11}

$$E = 2 \times 2808 \times 10^{11} \times 7 \text{ TeV} \sim \mathbf{0,6 \text{ GJ}}$$

0,6 GJ é a energia cinética de um TGV à velocidade de **200 km/h** !

...ou de um
carro a 3000
km/h !



Que partículas detectamos?

Deteccção de
forma indirecta

Deteccção de
forma directa

Leptões						
		Carga Eléctrica				
{	Tau		-1	Neutrino Tau		0
	Muão		-1	Neutrino Muão		0
	Electrão		-1	Neutrino Electrão		0

Interação muito fraca.
Difíceis de detetar!

Energia em falta! (MET)

Deteccção indirecta a
partir de partículas ou
jactos de partículas

Quarks					
Carga Eléctrica			Carga Eléctrica		
Bottom		-1/3	Top		2/3
Strange		-1/3	Charm		2/3
Down		-1/3	Up		2/3
cada quark  R,  B,  G 3 cores					




Muito pesado, mas
produzido em LHC

Deteccção indirecta a
partir de partículas ou
jactos de partículas


+ o fóton!

Detectores gigantes de neutrinos


SNO





SuperKamiokande



Sol em neutrinos




O caminho do Z



Distribuição da Massa do Z

em ATLAS
(simulação)




Interações Protão-Protão

Os prótons dos feixes tinham a energia de 3.5(4) TeV cada:

$$2 \times 3.5(4) \text{ TeV} = 7(8) \text{ TeV}$$


Os quarks e glúons constituintes do próton que colidem têm apenas uma **fração desta energia**. Novas partículas criadas na colisão têm *sempre* uma massa inferior a esta fração da energia.



Decaimentos de Partículas

Estamos à procura do bosão **Z**, uma partícula **sem carga eléctrica** que decai num **par muão-antimuão** ou num **par electrão-positrão***.

Que sabemos das cargas eléctricas dos pares?
Qual a carga eléctrica do Z?




**O bosão Z tem outros decaimentos... mas não estamos interessados nesses.*

Produção e Decaimento de Partículas

O tão procurado **bosão de Higgs (H)** foi encontrado nas experiências ATLAS e CMS no LHC do CERN em 2012.

Podemos ter acontecimentos
candidatos a bósons de Higgs
nos decaimentos

- $H \rightarrow ZZ \rightarrow 4 \text{ leptões}$
- $H \rightarrow \gamma\gamma$ (2 fótons)




Decaimentos de Partículas

Frequentemente quarks são dispersados em colisões.

Estes quarks dão origem a jatos de partículas.

Electrões e muões de baixa energia podem ser produzidos nos jatos.


Não são o que estamos à procura!



Decaimentos de Partículas

Um acontecimento “di-muão” ou “di-electrão” **pode** ser o decaimento da partícula em que estamos interessados.

Pode ser difícil reconhecer os traços que queremos, se não eliminarmos os traços de baixo momento transversal.



Decaimentos de Partículas


Se seleccionarmos só os traços com momento transverso superior a 10 GeV, ficamos com uma imagem mais nítida.

Hoje iremos seleccionar vários acontecimentos $Z \rightarrow e^+e^-$ e $Z \rightarrow \mu^+\mu^-$ e usar a informação de massa [invariante] m [c^2] para saber se descobrimos o bosão Z ou outras partículas.

$$E = mc^2 \Rightarrow E^2 = m^2 c^4 + c^2 p^2$$

$$E = E_1 + E_2 \quad p = |\vec{p}| = |\vec{p}_1 + \vec{p}_2|$$

$$m = \sqrt{(E_1 + E_2)^2 - c^2(\vec{p}_1 + \vec{p}_2)^2} / c^2$$





$$mc^2 \simeq \sqrt{2E_1 E_2 (1 - \cos \theta_{12})}$$

Espectro de massa de pares de muões

- Eventos com dois muões
- Pesquisa de partículas X que decaem em dois muões;
...e faz-se uma distribuição de:

$$m(X) = \frac{\sqrt{2E_1E_2(1 - \cos\theta_{12})}}{c^2}$$




Espectro de massa:
número de eventos
em função da massa

LHC 2010-11: Redescoberta do modelo padrão



Descoberta original



1933

1947

1964

1974

1977

1983

1995

2006

Dec 2009

Jan 2010

Feb








Mar

Apr

May

Jun

Jul 2010



Redescoberta no LHC




CMS Experiment at the LHC, CERN

Data recorded: 2012-May-13 20:08:14.621490 GMT

Run/Event: 194108 / 564224000

$H \rightarrow 2 \text{ fotões}$




Resultados de $H \rightarrow \gamma\gamma$:



Distribuição de massa dos 2 fótons, $m(\gamma\gamma)$

Soma das distribuições de cada classe de acontec., ponderada por S/B


Na distribuição de massa $\gamma\gamma$ há um excesso de acontecimentos sobre o fundo, para massas $\sim 125 \text{ GeV}/c^2$.



A observação do estado final em 2 fótons implica que a **nova partícula é um bóson**, não um fermião, e que **não pode ser uma partícula de “spin 1”**.

Não há outra partícula fundamental com estas propriedades!



ATLAS: Distribuição de massa dos 2 fótons, $m(\gamma\gamma)$



Resultados do H decaindo em ZZ*



Distribuição de massa de 4 leptões, $m(4l)$




Distribuição de massa para os 4 leptões


(dois pares elétron-positrão, ou dois pares de múons, ou um par de elétrons e um par de múons).

Visualizador de Acontecimentos HYPATIA

=> cuts: $P_t > 5.0-10.0$ GeV




HYPATIA: $Z \Rightarrow e^+ e^-$




$\Lambda \pi^-$
 $\hookrightarrow \rho \pi^-$

HYPATIA: $Z \Rightarrow \mu^+ \mu^-$




$\Lambda \pi^-$
 $\hookrightarrow \rho \pi^-$

HYPATIA: $Z \Rightarrow \mu^+ \mu^-$




$\Lambda \pi^-$
 $\rightarrow \rho \pi^-$

HYPATIA: $Z \Rightarrow \gamma \gamma$



HYPATIA: $Z \Rightarrow$ jatos (fundo)




$\hookrightarrow p\pi$

HYPATIA: Salvar os dados!!!



UPLOAD para: <http://cernmasterclass.uio.no/OPlot/>

Análise do Histograma



Pico bem definido

Caudas: frequências baixas


Onde estão os picos?

Que partículas identificamos?

Algum pico em $m(4l)$?

Algum pico em $m(\gamma\gamma)$?

Análise do Histograma



Dois picos:

- Pobre definição do sinal ou
- Dois sinais diferentes?

Em Física de Partículas, pode ser:

- Duas Partículas diferentes ou
- Grande “sinal” vindo do “fundo” e um “montinho” mostrando a partícula em estudo.

Vamos ao trabalho - Z!

Façam equipas de dois.

Pratiquem um pouco (exercício 1).

Fale com os físicos.

Encontre bons candidatos Z.

Que acontecimentos irá incluir na distribuição $M(X)$?

Que partículas irá inserir para calcular a massa?

Descobriu algum Candidato a Bosão de Higgs?

...E faça a distribuição!


Reporte! Relate! Ria! Relaxe!

**OBRIGADO PELA
VOSSA ATENÇÃO**

$$\begin{aligned} & \cdot \bar{K}^0 \rightarrow \Omega^- K^0 K^+ \pi^+ \pi^- \\ & \quad \hookrightarrow \Xi^- \pi^0 \\ & \quad \hookrightarrow \Lambda \pi^- \\ & \quad \hookrightarrow p \pi^- \end{aligned}$$

O Caminho do W

IDEIA DESESPERADA



Wolfgang Pauli



Original - Photocopy of PCC 0373
Abschrift/15.12.56

Offener Brief an die Gruppe der Radioaktiven bei der
Gauvereins-Tagung zu Tübingen.

Abschrift

Physikalisches Institut
der Eidg. Technischen Hochschule
Zürich

1930

Zürich, li. Des. 1930
Gloriastrasse

Liebe Radioaktive Damen und Herren,


Wie der Ueberbringer dieser Zeilen, den ich halbvolllst
ansprechen bitte, Ihnen das näheren auseinanderzusetzen wird, bin ich
angelegentlich der "falschen" Statistik der β - und α -Kerne, sowie
des kontinuierlichen β -Spektrums auf einen Weg gekommen, der mich
verfallen um den "Wechselstrom" (1) der Statistik und Bergwerks
zu retten. Nämlich die Möglichkeit, es könnten also fiktive neutrale
Teilchen, die ich Neutronen nennen will, in den Kernen existieren,
welche den Spin $1/2$ haben und das Anschliessen an Elektronen und
auch von Lichtquanten ausserdem noch dadurch zu beschreiben, dass sie
nicht mit Lichtgeschwindigkeit laufen. Die Neutronen Masse sein und
jedenfalls nicht grösser als 0,01 Protonen Masse. Das kontinuierliche
 β -Spektrum wäre dann verständlich und die Neutronen würden beim
 β -Zerfall mit dem Elektron jeweils noch ein Neutron emittieren und
wird, derart, dass die Summe der Neutronen und Elektronen konstant ist.

Nun handelt es sich um eine neue Kraft, welche Kräfte auf die
Neutronen wirken. Das wahrscheinliche Modell für das Neutron scheint
mir aus wellenmechanischen Gründen ein solches zu sein, das Ueberbringer
dieser Zeilen) diesen zu sein. Das fiktive Neutron ein
materieller Körper von einer gewissen Masse zu sein. Die Experimente
verleihen wohl, dass die ionisierende Wirkung eines solchen Neutrons
nicht grösser sein könnte, als eines γ -Strahls und darf dann
wohl nicht grösser sein, als $\sim 10^{-10}$ cm.

Ich treue mich, aber nicht, etwas über diese Idee
zu publizieren und auch erst vertrauensvoll an Sie, liebe
Radioaktive, mitzuteilen, wie es um den experimentellen Nachweis
eines solchen Neutrons, wenn dieses ein solches oder etwas
längeres Leben zu vermag, zu sein würde, wie ein
 γ -Strahl.

Ich gebe zu, dass mein Ausweg vielleicht von vornherein
wenig wahrscheinlich erscheinen wird, weil man die Neutronen, wenn
sie existieren, wohl schon längst gesehen hätte. Aber nur wer wagt,
gemacht und der Ernst der Situation beim kontinuierlichen β -Spektrum
wird durch einen Ausweg seines veränderten Verlaufs in der
Herrn Debye, beleuchtet, der mir Mithras in Basel gesagt hat:
"O, daran soll man am besten gar nicht denken, sowie an die neuen
Sternen." Darum soll man jeden Weg zur Rettung ernstlich diskutieren.
Also, liebe Radioaktive, prüft es. Leider kann ich nicht
persönlich in Tübingen erscheinen, da ich infolge eines in der Nacht
Des. in Zürich stattfindenden Balles hier unabkömmlich
bin. Allen Grüßen an Sie, sowie an Herrn Back, hier
in der Diener.

gsm. W. Pauli




Enrico Fermi
(1934)



TENTATIVO DI UNA TEORIA DEI RAGGI β

Nota (*) di ENRICO FERMI



bosão $W^{+/-}$

Prémio
Nobel
1979




Glashow



Weinberg



Salam




P.N.1984






Os bosões W^+ e W^-

- ❖ Propostos em 1967-69 com Glashow, Weinberg, Salam
- ❖ Descobertos no CERN em 1983 (P.Nobel 1984)
- ✓ Têm cargas elétricas ($+e$, $-e$) [$1\ e = 1,6 \times 10^{-19}\ \text{C}$]
- ✓ Mediadores da interação nuclear FRACA (com o Z)
- ✓ Produzidos no LHC a partir do choque de glúons contra quarks, ou de glúons contra glúons:




66%



34%

Os bosões W^+ e W^-

- ✓ Têm massas muito elevadas: $\sim 80 \text{ GeV}/c^2$ ($\sim 85 m_p$)
- ✓ Vida média muito reduzida: $\sim 10^{-25} \text{ s}$
- ✓ 2/3 dos decaimentos de um bosão $W^{+/-}$ são para quarks
1/3 dos decaimentos de um bosão $W^{+/-}$ são para um leptão e um neutrino do leptão.
- ✓ Modos de decaimento a explorar hoje: eletrão/muão (+ ν)!



CRITÉRIOS:

- Missing ET $> 25 \text{ GeV}$
- 1 leptão isolado energético – eletrão ou muão

Higgs? :



- 2 leptões isolados energéticos de cargas opostas!

($\rightarrow W^+W^-$)

- Missing ET $> 25 \text{ GeV}$ ($> 40 \text{ GeV}$ se leptões = 's')


Detector ATLAS

- 46 m (comprimento) x 25 m (diâmetro)
- 7000 toneladas
- 100 milhões de canais de electrónica



$$\begin{aligned} & K^+ p \rightarrow \Omega^- K^0 K^+ \pi^+ \pi^- \\ & \quad \hookrightarrow \Xi^- \pi^0 \\ & \quad \hookrightarrow \Lambda \pi^- \\ & \quad \hookrightarrow p \pi^- \end{aligned}$$




Detector ATLAS




Detector ATLAS

ATLAS

animation



End view





Side view

Created by Jeřábek, Jende 2010

(animação exterior)

Introdução ao MINERVA



Lembrem-se...

“Certo dia dizia um filósofo: ‘É necessário para a própria existência da Ciência que as mesmas condições produzam sempre os mesmos resultados!’.

Bem, não produzem!”

Richard P. Feynman (1918-1988)

➤ Observações indirectas e pensamento lógico, crítico, e imaginativo, pode levar a conclusões lógicas e verdadeiras.

➤ Assim: Trabalhem em conjunto, pensem, e sejam críticos dos vossos resultados e dos dos outros colegas, para perceber bem o que se está a passar.

Vamos ao trabalho - W!

Façam equipas de dois.

Pratiquem um pouco (exercício 1).

Fale com os físicos.

Encontre bons candidatos W.

Qual a carga e tipo de partícula?

Que acontecimentos irá incluir na distribuição $\Delta\Phi$?

Descobriu algum Candidato a Bosão de Higgs?

...E faça a distribuição!

Reporte! Relate! Ria! Relaxe!

It's collaborative!

**Bloomberg
BusinessWeek**

VIEWPOINT May 20, 2009, 11:57AM EST

CERN's Collaborative Management Model

Business leaders could learn valuable leadership lessons from the collaborative management style at the Large Hadron Collider at CERN

By [Krisztina Holly](#)

As a business [leader](#), imagine trying to [manage](#) more than 7,000 scientists from 85 countries around the world—with their own languages, cultures, and expertise—on a 20-year collaboration to create the most complex system ever built.

